

# ФАГОДЕРМ

гель косметический с бактериофагами  
для проблемной кожи

## АННОТАЦИЯ

### Назначение

Гель косметический с бактериофагами для проблемной кожи «Фагодерм» (далее – **Фагодерм**) применяют с целью нормализации микрофлоры и профилактики бактериальных инфекций кожных покровов. **Фагодерм** содержит комплекс из 47 видов бактериофагов коллекции ООО НПЦ «МикроМир», подавляющих рост актуальных штаммов следующих патогенных бактерий:

- *Acinetobacter baumannii*
- *Bacteroides fragilis*
- *Bacteroides spp.*
- *Citrobacter freundii*
- *Corynebacterium spp.*
- *Enterobacter spp.*
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella spp.*
- *Propionibacterium acnes*
- *Providencia rettgeri*
- *Proteus mirabilis*
- *Proteus vulgaris*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Staphylococcus aureus*
- *Staphylococcus epidermidis*
- *Streptococcus pyogenes*

### Практика применения бактериофагов

Бактериофаги (с др.-гр. – «пожиратели бактерий») – вирусы, избирательно поражающие бактерии: каждый вид бактериофагов активен только в отношении определённого вида бактерий и нейтрален в отношении других видов. В клинической практике используются бактериофаги, которые уничтожают патогенные бактерии, не нарушая нормофлору человека. Это позволяет применять их у всех категорий пациентов (включая новорожденных, беременных и кормящих женщин) как эффективное и безопасное антибактериальное средство профилактики и терапии, а также в комбинации с антибиотиками. («Принципы использования бактериофагов для борьбы с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Методические рекомендации». М., 2014).

Особую актуальность имеет профилактическое применение бактериофагов в тех случаях, когда клинические признаки бактериального инфицирования отсутствуют, но существует риск их появления. В результате применения бактериофагов снижается общее число патогенных бактерий, поддерживается нормальный баланс микрофлоры.

### Форма выпуска

Гель во флаконе 50 мл с дозатором и защитным колпачком.

### Состав

- стерильная суспензия фаговых частиц в физиологическом растворе;
- вспомогательные вещества: вода очищенная, карбопол, экстракт календулы, нипазол.

### Рекомендации по применению

- Уход за кожей у здоровых людей, в том числе с целью нормализации микрофлоры, устранения неприятного запаха в зонах повышенного потоотделения.
- Профилактика бактериальных воспалительных заболеваний кожных покровов и мягких тканей при наличии факторов риска: сахарного диабета, онкологических заболеваний (при проведении лучевой и химиотерапии), сниженном местном и общем иммунитете. Профилактика бактериальных осложнений при грибковых и вирусных поражениях кожи, аутоиммунных и других системных заболеваниях.
- Антибактериальная защита кожных покровов и мягких тканей при различного рода поражениях: ожогах, ранах, порезах, укусах насекомых и животных, травмах, трещинах (в т.ч. при маститах у женщин в послеродовом периоде), потёртостях и опрелостях. Обработка пуповины у новорожденных.
- Профилактика бактериальных осложнений при заболеваниях кожи различного генеза: акне, гнездной алопеции, атопическом дерматите, микозах, пиодермиях, псориазе, дерматозах, розацеа, чесотке, экземе.
- Профилактика бактериальных осложнений в профессиональной косметологии при проведении процедур (включая различные инвазивные процедуры), лазерной шлифовке кожи, механической чистке лица и т.д.
- Профилактика бактериальных осложнений перед и после хирургических вмешательств. Обработка швов в послеродовом периоде у женщин.
- По назначению врача в других клинических ситуациях, при которых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и отсутствие побочных эффектов.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам **Фагодерма**.

### Способ применения

- В домашних условиях **Фагодерм** наносят тонким слоем (не втирая) на поражённый/травмированный участок кожи. Обработанный участок не мочить (гель не смывать) в течение 40 минут после применения **Фагодерма**.
- В условиях использования специалистом **Фагодерм** наносят тонким слоем (не втирая) на поражённый/травмированный участок кожи или на перевязочный материал. Обработанный участок кожи не мочить (гель не смывать) в течение 40 минут после применения **Фагодерма**.

**ВАЖНО!** Не вносить **Фагодерм** в закрытые очаги воспаления, не имеющие или имеющие ограниченный отток экссудата из очага (например, ушитые раны и т.п.). Внесение **Фагодерма** в такие очаги может привести к выраженному обострению воспалительного процесса.

### Схемы применения и дозы

- **Уход за кожей у здоровых людей, в том числе с целью нормализации микрофлоры, устранения неприятного запаха в зонах повышенного потоотделения:**  
**Фагодерм** наносят 2–3 раза в день после гигиенических мероприятий.  
Дозы **Фагодерма** определяются индивидуально в зависимости от площади обрабатываемого участка кожи.  
Длительность профилактического курса от 7 до 14 дней. Курс рекомендуется повторять каждый месяц.

- Профилактика бактериальных воспалительных заболеваний кожных покровов и мягких тканей при наличии факторов риска: сахарного диабета, онкологических заболеваний (при проведении лучевой и химиотерапии), сниженном местном и общем иммунитете. Профилактика бактериальных осложнений при грибковых и вирусных поражениях кожи, аутоиммунных и других системных заболеваниях:

**Фагодерм** наносят 2–3 раза в день после гигиенических мероприятий.

Дозы **Фагодерма** определяются индивидуально в зависимости от площади обрабатываемого участка кожи.

Длительность профилактического курса неограничена.

- Антибактериальная защита кожных покровов и мягких тканей при различного рода поражениях: ожогах, ранах, порезах, укусах насекомых и животных, травмах, трещинах (в т.ч. при маститах у женщин в послеродовом периоде), потёртостях и опрелостях. Для обработки пуповины у новорожденных:

**Фагодерм** наносят 3–4 раза в день после гигиенических мероприятий до исчезновения признаков травмы, ожога, поражения и/или клинических симптомов.

Дозы **Фагодерма** определяются индивидуально в зависимости от площади обрабатываемого участка кожи.

- Профилактика бактериальных инфекций при заболеваниях кожи различного генеза: акне, гнездной алопеции, атопическом дерматите, микозах, пиодермиях, псориазе, дерматозах, розацеа, чесотке, экземе:

доза **Фагодерма** определяется врачом, исходя из клинической ситуации. **Фагодерм** наносят после проведения гигиенической обработки и лечебных манипуляций до исчезновения признаков клинических симптомов.

**Фагодерм** рекомендуется сочетать с применением в домашних условиях: **Фагодерм** наносят 3–4 раза в день после гигиенических мероприятий до исчезновения клинических симптомов.

- Профилактика бактериальных осложнений в профессиональной косметологии при проведении процедур (включая различные инвазивные процедуры), лазерной шлифовке кожи, механической чистке лица и т.д.:

доза **Фагодерма** зависит от проводимой косметологической процедуры. **Фагодерм** наносят после проведения гигиенических и косметологических манипуляций и выдерживают, не смывая, в течение 10–20 минут. При необходимости проводятся 2–3 дополнительные процедуры с интервалом 2–3 дня.

Рекомендуется сочетать с применением в домашних условиях: **Фагодерм** наносят 2–3 раза в день после гигиенических мероприятий до исчезновения клинических симптомов. Дозы **Фагодерма** определяются индивидуально в зависимости от площади обрабатываемого участка кожи.

- Профилактика бактериальных осложнений перед и после хирургических вмешательств (в т.ч. при обработке швов в послеродовом периоде у женщин):

доза **Фагодерма** определяется врачом, исходя из клинической ситуации. Перед хирургическим вмешательством – 2–3 раза в день после гигиенических мероприятий в течение 7 дней до начала вмешательства. После хирургического вмешательства – 2–3 раза в день после гигиенических мероприятий в течение 7 дней.

- По назначению врача в других клинических ситуациях, при которых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и отсутствие побочных эффектов:

врач определяет схему применения, кратность и объём использования **Фагодерма**, исходя из клинической ситуации.

**ВАЖНО!** На начальном этапе при наличии воспалительного очага рекомендуется более частое применение **Фагодерма** с интервалом 1–2 часа до исчезновения клинических симптомов и болевых ощущений. Врач может изменить схему применения, кратность и объём использования **Фагодерма**, исходя из клинической ситуации.

## Взаимодействие

- Антибактериальные препараты системного действия:

- **Фагодерм** можно применять одновременно с системной антибактериальной терапией.

- Антисептические, антибактериальные и другие препараты местного действия:

- Допустимо совместное применение **Фагодерма** с растворами хлоргексидина биглюконата 0,05 % и 0,2 %, гидроксиметилхиноксалиндиоксида 2,0 %, средствами с метронидазолом, мазями с хлорамфениколом и метилурацилом.

- Допустимо последовательное применение **Фагодерма** с интервалом не менее 20 минут после использования следующих средств:

- на основе октенидина и феноксиэтанола;
- на основе солей полиакриловой кислоты;
- растворов перекиси водорода;
- на основе повидон-йода.

## Особые указания

Предохранять дозатор от попадания грязи и инородных веществ. Очищать носик дозатора и колпачок от остатков геля. После использования следует всегда закрывать дозатор защитным колпачком.

## Условия транспортировки, хранения и срок годности

До начала использования допускается транспортировка при температуре от 2 °С до 25 °С в течение 14 суток. Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С в течение 24 месяцев. После начала использования допускается кратковременное хранение **Фагодерма** при комнатной температуре (не более 25 °С) при условии соблюдения стерильности и использовании всего содержимого флакона в течение 60 дней. Тем не менее, в домашних условиях предпочтительным местом хранения **Фагогина** является холодильник.

## Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.АГ96.В.03376 от 05.11.2014, ТР ТС 009/2011

## Произведено и упаковано

ООО «НВЦ Агроветзащита С.-П.», Россия, 141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 для ООО НПЦ «МикроМир», Россия, 107031, г. Москва, пер. Нижний Кисельный, д. 5/23, стр. 1.

## Реквизиты организации, уполномоченной принимать претензии от потребителей

ООО НПЦ «МикроМир», Россия, 107031, г. Москва, пер. Нижний Кисельный, д. 5/23, стр. 1.

Тел. 8 (495) 625-32-65. [www.micro-world.ru](http://www.micro-world.ru).