

ОТОФАГ

гель с бактериофагами

АННОТАЦИЯ

Назначение

Гель с бактериофагами для гигиены кожи ушных раковин «Отофаг» (далее – **Отофаг**) применяют с целью нормализации микрофлоры и профилактики гнойно-воспалительных заболеваний бактериальной этиологии уха, горла и носа. **Отофаг** содержит комплекс из 32 видов бактериофагов коллекции ООО НПЦ «Микромир», подавляющих рост актуальных штаммов следующих патогенных бактерий:

- *Bacteroides spp.*
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus influenzae*
- *Klebsiella spp.*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Morganella morganii*
- *Neisseria spp.*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia rettgeri*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus pyogenes*

Практика применения бактериофагов

Бактериофаги (с др.-гр. – «пожиратели бактерий») – вирусы, избирательно поражающие бактерии: каждый вид бактериофагов активен только в отношении определённого вида бактерий и нейтрален в отношении других видов. Бактериофаги уничтожают патогенные бактерии, не нарушая нормофлору человека. Это позволяет применять их у всех категорий пациентов (включая новорожденных, беременных и кормящих женщин) как эффективное и безопасное антибактериальное средство для профилактики и терапии, в т. ч. в комбинации с антибиотиками. («Принципы использования бактериофагов для борьбы с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Методические рекомендации». М., 2014). Особую актуальность имеет профилактическое использование бактериофагов в тех случаях, когда клинические признаки бактериального инфицирования отсутствуют, а применение антибиотиков нежелательно из-за их побочных эффектов. В результате применения бактериофагов снижается общее число патогенных бактерий, поддерживается нормальный баланс микрофлоры.

Форма выпуска

Гель во флаконе 50 мл с дозатором и защитным колпачком.

Состав

- активные вещества: стерильная суспензия фаговых частиц в физиологическом растворе;
- вспомогательные вещества: вода очищенная, карбопол, экстракт календулы, нипазол.

Рекомендации по применению

- Профилактика осложнений бактериальной этиологии при ОРВИ и других респираторных заболеваниях. Профилактика и комплексное лечение воспалительных заболеваний уха (наружный и средний отит); носа (синусит, ринит); горла (фарингит, аденоидит, ангина, ларингит, хронический тонзиллит).
- Профилактика воспалительных заболеваний бактериальной этиологии при наличии факторов риска: сахарного диабета, онкологических заболеваний (при проведении лучевой и химиотерапии), сниженном иммунитете. Профилактика бактериальных осложнений при грибковых и вирусных инфекциях ЛОР-органов, аутоиммунных и других системных заболеваниях.
- Санация носителей золотистого стафилококка среди медицинского персонала.
- Профилактика бактериальных осложнений при хирургических вмешательствах и других лечебных манипуляциях в области ЛОР-органов.
- По назначению врача в других клинических ситуациях, при которых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и отсутствие побочных эффектов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам **Отофага**.

Способ применения

- **Отофаг** наносят на пораженный участок непосредственно из флакона или салфеткой (марлевым тампоном), шпательем. Безопасен при проглатывании. Гель не смывать в течение 40 минут после применения **Отофага**.

ВАЖНО! **Отофаг** безопасен при попадании на слизистую и при проглатывании. Не вносить **Отофаг** в закрытые очаги воспаления, не имеющие или имеющие ограниченный отток экссудата из очага (например, уштные раны и т. п.). Внесение **Отофага** в такие очаги может привести к усилению отёка за счет массивного распада бактериальных клеток.

Схемы применения и дозы

- Профилактика осложнений бактериальной этиологии при ОРВИ и других респираторных заболеваниях. Профилактика и комплексное лечение воспалительных заболеваний уха (наружный и средний отит); носа (синусит, ринит); горла (фарингит, аденоидит, ангина, ларингит, хронический тонзиллит):
1–2-е сутки 1 мл **Отофага** (одно нажатие) вводится в патологический очаг 3–4 раза в сутки; 3–5-е сутки 1 мл **Отофага** 2–3 раза в сутки, 5–14-е сутки 1 мл **Отофага** 2 раза в сутки.
- Профилактика воспалительных заболеваний бактериальной и смешанной этиологии при наличии факторов риска: сахарного диабета, онкологических заболеваний (при проведении лучевой и химиотерапии), сниженном иммунитете. Профилактика бактериальных осложнений при грибковых и вирусных инфекциях ЛОР-органов, аутоиммунных и других системных заболеваниях:
1 мл **Отофага** (одно нажатие) вводится в патологический очаг 2–3 раза в сутки. Длительность курса не ограничена.
- Санация носоглотки носителей золотистого стафилококка среди медицинского персонала:
по 1 мл **Отофага** вводить интраназально в каждый носовой ход 2 раза в сутки. Длительность курса 7 дней.
- Профилактика бактериальных осложнений при хирургических вмешательствах и других лечебных манипуляциях в области ЛОР-органов:
доза **Отофага** определяется врачом, исходя из клинической ситуации. После гигиенических мероприятий в течение 7 суток до начала хирургического вмешательства – 2–3 раза в день. После хирургического вмешательства – 2–3 раза в день в течение 7 суток. Длительность применения определяется врачом.
- По назначению врача в других клинических ситуациях, при которых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и отсутствие побочных эффектов:
врач определяет схему применения, кратность и объём использования **Отофага**, исходя из клинической ситуации.

ВАЖНО! На начальном этапе при наличии воспалительного очага рекомендуется более частое применение **Отофага** с интервалом 1–2 часа.

Взаимодействие

- Антибактериальные препараты системного действия:
 - **Отофага** можно применять одновременно с системной антибактериальной терапией.
- Антисептические, антибактериальные и другие препараты местного действия:
 - Допустимо совместное применение **Отофага** с растворами хлоргексидина биглюконата 0,05 % и 0,2 %, гидроксиметилхиноксалиндиоксида 2,0 %, гелями с метронидазолом, мазями с хлорамфениколом и метилурацилом.
 - Допустимо последовательное применение **Отофага** с интервалом не менее 20 мин. после использования следующих средств: на основе октенидина и феноксиэтанола, на основе солей полиакриловой кислоты, растворов перекиси водорода, на основе повидон-йода.

Особые указания

Предохранять дозатор от попадания грязи и инородных веществ. Очищать носик дозатора и колпачок от остатков геля. После использования следует всегда закрывать дозатор колпачком.

Условия хранения и срок годности

До начала использования допускается транспортировка при температуре от 2 °С до 25 °С в течение 14 суток. Хранить сухом, защищённом от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С в течение 24 месяцев. После начала использования допускается кратковременное хранение **Отофага** при комнатной температуре (не более 25 °С) в условиях соблюдения стерильности и использовании всего содержимого флакона в течение 60 дней. В домашних условиях предпочтительным местом хранения **Отофага** является холодильник.

Декларация о соответствии

№ ТС RU Д-РУ.АГ96.В.06175 от 30.06.2015 г., ТР ТС 009/2011.

Произведено и упаковано

ООО «НВЦ Агроветзащита С.-П.», Россия, 141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 по заказу ООО НПЦ «МикроМир», Россия, 107031, г. Москва, пер. Нижний Кисельный, д. 5/23, стр. 1.

Реквизиты организации, уполномоченной принимать претензии от потребителей

ООО НПЦ «МикроМир», Россия, 107031, г. Москва, пер. Нижний Кисельный, д. 5/23, стр. 1.
Тел. 7 (495) 625 32 65. www.micro-world.ru.